

## 【使用上の注意】改訂のお知らせ

2008年11月

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

不整脈治療剤・糖尿病性神経障害治療剤

劇薬、指定医薬品、処方せん医薬品<sup>注)</sup>

**メキシチール<sup>®</sup>カプセル50mg**

**メキシチール<sup>®</sup>カプセル100mg**

**Mexitil<sup>®</sup>Capsules 50mg・100mg**

(メキシレチン塩酸塩製剤)

®=登録商標

注) 注意—医師等の処方せんにより使用すること

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につきましてご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、メキシチール<sup>®</sup>カプセル 50mg・100mg の【使用上の注意】を下記のとおり改訂致しましたので、お知らせ申し上げます。

つきましては、今後の使用に際しまして遵守して頂きますようお願い申し上げます。

なお、メキシチール<sup>®</sup>カプセル 50mg・100mg につきましては、薬食発第 1003001 号 (平成20年10月3日付) にて再審査結果が通知され、「効能又は効果」及び「用法及び用量」は承認のとおり認められましたことを、併せてお知らせ申し上げます。

謹言

改訂内容 ( \_\_\_\_\_ 部 追加・改訂)

改 訂 後	改 訂 前
<p><b>【用法・用量】</b> ＜用法・用量に関連する使用上の注意＞</p> <p>1. 頻脈性不整脈（心室性）に投与する場合 1日用量 450mg を超えて投与する場合、副作用発現の可能性が増大するので注意すること。（「過量投与」の項参照）</p> <p>2. 糖尿病性神経障害に伴う自覚症状（自発痛、しびれ感）の改善を目的として投与する場合 (1) 2週間投与しても効果が認められない場合には、投与を中止すること。（「重要な基本的注意」の項(5)の 1)、3)参照） (2) 1日 300mg の用量を超えて投与しないこと。（「重要な基本的注意」の項(5)の 2)参照）</p>	<p><b>【用法・用量】</b> ＜用法・用量に関連する使用上の注意＞</p> <p>1. 頻脈性不整脈（心室性）に投与する場合 1日用量 450mg を超えて投与する場合、副作用発現の可能性が増大するので注意すること。（「過量投与」の項参照）</p> <p>2. 糖尿病性神経障害に伴う自覚症状（自発痛、しびれ感）の改善を目的として投与する場合 (1) 糖尿病性神経障害での4週間を超える使用経験は少ないので、本剤の投与期間は4週間をめどとすること。なお、2週間投与しても効果が認められない場合には、投与を中止すること。（「重要な基本的注意」の項(5)の 1)、3)、4)参照） (2) 1日 300mg の用量を超えて投与しないこと。（「重要な基本的注意」の項(5)の 2)参照）</p>
<p><b>【使用上の注意】</b> 2. 重要な基本的注意 (5)糖尿病性神経障害の患者に投与する場合 1) 本剤による治療は原因療法ではなく対症療法であるので、漫然と投与しないこと。</p>	<p><b>【使用上の注意】</b> 2. 重要な基本的注意 (5)糖尿病性神経障害の患者に投与する場合 1) 本剤による治療は原因療法ではなく対症療法であるので、漫然と投与しないこと。</p>

<p>2) 糖尿病性神経障害の患者に対し1日 300mg を超える投与での安全性は確立していない。(使用経験が少ない。)</p> <p>3) 2週間投与しても症状の改善が認められない場合は投与を中止し、血糖コントロールや食事療法等の適切な治療を継続すること。</p> <p>4) 糖尿病性神経障害の患者では、下肢の状態を十分に観察すること。(本剤の投与により疼痛が緩解され、末梢血管障害性の下肢の潰瘍や壊疽の進行を看過するおそれがある。)</p>	<p>2) 糖尿病性神経障害の患者に対し1日 300mg を超える投与での安全性は確立していない。(使用経験が少ない。)</p> <p>3) 2週間投与しても症状の改善が認められない場合は投与を中止し、血糖コントロールや食事療法等の適切な治療を継続すること。</p> <p>4) 糖尿病性神経障害での4週間を超える使用経験は少なく、長期投与に対する安全性は確立していない。</p> <p>5) 糖尿病性神経障害の患者では、下肢の状態を十分に観察すること。(本剤の投与により疼痛が緩解され、末梢血管障害性の下肢の潰瘍や壊疽の進行を看過するおそれがある。)</p>
---	--

<p><b>4. 副作用</b> 頻脈性不整脈(心室性)を対象とした調査症例 6,328 例(承認時 698 例、再審査終了時 5,630 例)中副作用が報告されたのは 605 例(9.56%)であった。また、糖尿病性神経障害を対象とした調査症例 3,673 例(承認時 276 例、再審査終了時 3,397 例)中副作用が報告されたのは 279 例(7.60%)であった。 主な副作用は嘔気 213 件(2.13%)、腹痛 181 件(1.81%)、食欲不振 115 件(1.15%)、消化不良 107 件(1.07%)、嘔吐 62 件(0.62%)等であった。また、臨床検査値においては特に一定の傾向を示す変動は認められていない。</p>	<p><b>4. 副作用</b> 頻脈性不整脈(心室性)を対象とした調査症例 6,328 例(承認時 698 例、再審査終了時 5,630 例)中副作用が報告されたのは 605 例(9.56%)であった。また、糖尿病性神経障害を対象とした調査症例 446 例(承認時 276 例、市販後の使用成績調査 170 例)中副作用が報告されたのは 86 例(19.28%)であった。 主な副作用は嘔気 176 件(2.60%)、腹痛 167 件(2.47%)、食欲不振 103 件(1.52%)、消化不良 84 件(1.24%)、嘔吐 57 件(0.84%)等であった。また、臨床検査値においては特に一定の傾向を示す変動は認められていない。</p>
---	--

<p><b>(1) 重大な副作用</b> <b>2) 過敏症症候群(頻度不明)</b>: 初期症状として発疹、発熱がみられ、さらにリンパ節腫脹、肝機能障害、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。</p>	<p><b>(1) 重大な副作用</b> <b>2) 遅発性の重篤な過敏症状</b>: 初期症状として発疹、発熱がみられ、さらにリンパ節腫脹、肝機能障害、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状(頻度不明)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。</p>
--	---

<b>(3) その他の副作用</b>				<b>(3) その他の副作用</b>			
	0.1~5%未満	0.1%未満	頻度不明		0.1~5%未満	0.1%未満	頻度不明
循環器	動悸	徐脈、起立時めまい、QRS 延長、 <u>血圧上昇</u> 、 <u>浮腫</u> 、 <u>胸部圧迫感</u> 、 <u>心房細動</u>	低血圧	循環器	徐脈、起立時めまい、QRS 延長、 <u>血圧上昇</u> 、 <u>動悸</u> 、 <u>浮腫</u> 、 <u>胸部圧迫感</u>		低血圧、心房細動
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃・腹部不快感、口渇、便秘、下痢、腹部膨満感、消化不良、腹痛	嚥下障害、口唇炎、舌炎、 <u>胃痛</u>	食道炎、食道潰瘍	消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃・腹部不快感、胃痛、口渇、便秘、下痢、腹部膨満感、消化不良、腹痛	嚥下障害、口唇炎、舌炎	食道炎、食道潰瘍
中略				中略			
過敏症	そう痒感、全身発疹	発熱、蕁麻疹、 <u>紅斑</u>	多形(滲出性)紅斑	過敏症	紅斑、そう痒感、全身発疹	発熱、蕁麻疹	多形(滲出性)紅斑
中略				中略			
血液 <sup>注2)</sup>		白血球数異常、赤血球減少、 <u>血色</u>	顆粒球減少	血液 <sup>注2)</sup>		白血球異	顆粒球減少

		素量減少、ヘマトクリット減少、血小板数異常、好酸球増多、リンパ球減少、好中球増多				常、赤血球減少、血色素量減少、ヘマトクリット減少、血小板異常、好酸球増多、リンパ球減少、好中球増多	
中略				中略			
その他		咽頭異和感、にがみ、倦怠感、咳、足のこわばり、血清カリウム、総コレステロールの上昇、 <u>脱力感、ほてり</u>	味覚異常	その他	脱力感、ほてり	咽頭異和感、にがみ、倦怠感、咳、足のこわばり、血清カリウム、総コレステロールの上昇	味覚異常

## 改訂理由(自主改訂)

### **糖尿病性神経障害での4週間を超える投与に関する注意の削除：**

薬食発第1003001号(平成20年10月3日付)にて「糖尿病性神経障害に伴う自覚症状(自発痛、しびれ感)の改善」の効能・効果及び用法・用量に関する再審査結果が通知されました。その審査過程において、糖尿病性神経障害への4週間を超える投与について、使用経験が集積されたこと、また、有効性、安全性に問題がないことが認められたことから、4週間を超える投与に関する注意を削除することが了承されました。このため、「用法・用量に関連する使用上の注意」及び「重要な基本的注意」の項の該当の記載を削除いたしました。

### **副作用の発生状況概要ならびに発現頻度の変更：**

薬食発第1003001号(平成20年10月3日付)にて「糖尿病性神経障害に伴う自覚症状(自発痛、しびれ感)の改善」の効能・効果及び用法・用量に関する再審査結果が通知されたことから、本再審査対象となった調査症例の成績を合算し、再集計を行いました。

### **重大な副作用の「遅発性の重篤な過敏症状」の「過敏症症候群」への変更：**

重大な副作用の項に記載の「遅発性の重篤な過敏症状」については、これまで、厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡(平成14年7月10日付)に基づいて記載し、注意喚起を行って参りました。しかしながら、その後、「過敏症症候群」という用語が一般的に使用されるようになってきたため、変更いたしました。

### **その他の副作用の「血小板異常、白血球異常」の「血小板数異常、白血球数異常」への変更：**

その他の副作用の項に記載の「血小板異常」および「白血球異常」については、報告された症例は形態の異常ではなく数の増減であったため、より適切な表現に改めました。

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 No.175 (2008年12月上旬発行予定)」に掲載されます。

P.4~5に改訂後の【使用上の注意】全文を記載しておりますので、併せてご参照ください。



# メキシチール®カプセル50mg メキシチール®カプセル100mg

改訂後の【使用上の注意】（~~~~部 追加・改訂）

\*2008年11月改訂

## 【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 重篤な刺激伝導障害（ペースメーカー未使用のⅡ～Ⅲ度房室ブロック等）のある患者  
[刺激伝導障害の悪化、心停止を来すことがある。]

## 【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】

糖尿病性神経障害に伴う自覚症状（自発痛、しびれ感）の改善を目的として投与する場合：  
重篤な心不全を合併している患者  
[心不全を合併している糖尿病性神経障害患者に対する安全性は確立していない（使用経験がない）ので、重篤な心不全を合併している患者には、自覚症状（自発痛、しびれ感）に対する本剤の有益性が危険性（心不全の悪化、不整脈の誘発等）を上回ると判断される場合にのみ投与すること。]

## 【効能・効果】

1. 頻脈性不整脈（心室性）
2. 糖尿病性神経障害に伴う自覚症状（自発痛、しびれ感）の改善

## 【用法・用量】

1. 頻脈性不整脈（心室性）  
通常、成人にはメキシチレン塩酸塩として、1日300mgより投与をはじめ、効果が不十分な場合は450mgまで増量し、1日3回に分割し食後に経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。
2. 糖尿病性神経障害に伴う自覚症状（自発痛、しびれ感）の改善  
通常、成人にはメキシチレン塩酸塩として、1日300mgを1日3回に分割し食後に経口投与する。

## <用法・用量に関連する使用上の注意>

1. 頻脈性不整脈（心室性）に投与する場合：  
1日用量450mgを超えて投与する場合、副作用発現の可能性が増大するので注意すること。（「過量投与」の項参照）
2. 糖尿病性神経障害に伴う自覚症状（自発痛、しびれ感）の改善を目的として投与する場合：  
\* (1) 2週間投与しても効果が認められない場合には、投与を中止すること。（「重要な基本的注意」の項(5)の1)、3)参照）  
(2) 1日300mgの用量を超えて投与しないこと。（「重要な基本的注意」の項(5)の2)参照）

## 【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
  - (1) 基礎心疾患（心筋梗塞、弁膜症、心筋症等）のある患者  
[心機能抑制や催不整脈作用が出現することがある。]
  - (2) 軽度の刺激伝導障害（不完全房室ブロック、脚ブロック等）のある患者  
[刺激伝導障害を悪化させることがある。]
  - (3) 著明な洞性徐脈のある患者  
[徐脈を悪化させることがある。]
  - (4) 重篤な肝・腎障害のある患者  
[本剤の血中濃度が上昇することがある。（「薬物動態」の項参照）]
  - (5) 心不全のある患者  
[心不全を悪化、不整脈を悪化・誘発させることがあり、また、本剤の血中濃度が上昇することがある。]
  - (6) 低血圧の患者  
[循環状態を悪化させることがある。]
  - (7) パーキンソン症候群の患者  
[振戦を増強させることがある。]
  - (8) 高齢者  
[「重要な基本的注意」及び「高齢者への投与」の項参照]
  - (9) 血清カリウム低下のある患者  
[不整脈を誘発させることがある。]
  - (10) 他の抗不整脈薬による治療を受けている患者  
[有効性、安全性が確立していない。（「重要な基本的注意」の項(1)の3)、(4)及び「相互作用」の項参照）]
2. 重要な基本的注意
  - (1) 本剤の投与に際しては、頻回に患者の状態を観察し、心電図、脈拍、血圧、心胸比を定期的に調べる。PQの延長、QRS幅の増大、QTの延長、徐脈、血圧低下等の異常所見が認められた場合には、直ちに減量又は投与を中止すること。

特に、次の患者又は場合には、少量から開始するなど投与量に十分注意するとともに、頻回に心電図検査を実施すること。

- 1) 心不全のある患者又は基礎心疾患（心筋梗塞、弁膜症、心筋症等）があり、心不全を来すおそれのある患者  
（心室頻拍、心室細動等が発現するおそれが高いので、開始後1～2週間は入院させること。）
- 2) 高齢者  
（入院させて開始することが望ましい。）  
[「高齢者への投与」の項参照]
- 3) 他の抗不整脈薬との併用  
（有効性、安全性が確立していない。）
- (2) 紅斑、水疱・びらん、結膜炎、口内炎、発熱等があらわれた場合には中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、紅皮症の前駆症状である可能性があるため、投与を中止し、直ちに皮膚科専門医を受診させる等適切な処置を行うこと。
- (3) 頭がボーとする、めまい、しびれ等の精神神経系症状が発現し、増悪する傾向がある場合には、直ちに減量又は投与を中止すること。また、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
- (4) 他の抗不整脈薬（リン酸ジソピラミド）でテルフェナジンとの併用により、QT延長、心室性不整脈を起こしたとの報告がある。
- \* (5) 糖尿病性神経障害の患者に投与する場合
  - 1) 本剤による治療は原因療法ではなく対症療法であるので、漫然と投与しないこと。
  - 2) 糖尿病性神経障害の患者に対し1日300mgを超える投与での安全性は確立していない。（使用経験が少ない。）
  - 3) 2週間投与しても症状の改善が認められない場合は投与を中止し、血糖コントロールや食事療法等の適切な治療を継続すること。
  - 4) 糖尿病性神経障害の患者では、下肢の状態を十分に観察すること。（本剤の投与により疼痛が緩解され、末梢血管障害性の下肢の潰瘍や壊疽の進行を看過するおそれがある。）
3. 相互作用  
本剤は、主として薬物代謝酵素CYP1A2及びCYP2D6で代謝される。  
【併用注意】（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リドカイン プロカイナムド キニジン アプリンジン カルシウム拮抗剤 β受容体遮断剤	本剤の作用が増強することがある。	両剤の陰性変力作用と変伝導作用が相加的又は相乗的に増強することがある。
アミオダロン	Torsades de pointesを発現したとの報告がある。	機序不明。
胃排出能を抑制する薬剤 モルヒネ等	本剤の吸収が遅延することがある。	モルヒネ等により胃の運動が低下し、胃内容排出時間が延長すると、本剤の吸収が遅延することがある。
肝薬物代謝酵素機能（特にチトクロームP-450系のCYP1A2及び2D6）に影響を与える薬剤	本剤の血中濃度に影響を与えるおそれがある。	チトクロームP-450（CYP1A2、2D6）による本剤の代謝が影響を受けるおそれがある。
シメチジン	本剤の血中濃度が上昇することがある。	シメチジンによりチトクロームP-450の薬物代謝が阻害され本剤の血中濃度が上昇することがある。
リファンピシン フェントイン	本剤の血中濃度が低下することがある。	本剤の代謝が促進されることがある。
テオフィリン	テオフィリンの血中濃度が上昇することがある。	本剤はテオフィリンに比べ、チトクロームP-450への親和性が強く、テオフィリンの代謝が抑制される。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
尿のpHをアルカリ化させる薬剤 炭酸水素ナトリウム等	本剤の血中濃度が上昇することがある。	アルカリ性尿は、本剤の腎排泄を抑制する。
尿のpHを酸性化させる薬剤 塩化アンモニウム等	本剤の血中濃度が低下することがある。	酸性尿は、本剤の腎排泄を促進する。

#### 4. 副作用

\* 頻脈性不整脈(心室性)を対象とした調査症例6,328例(承認時698例、再審査終了時5,630例)中副作用が報告されたのは605例(9.56%)であった。また、糖尿病性神経障害を対象とした調査症例3,673例(承認時276例、再審査終了時3,397例)中副作用が報告されたのは279例(7.60%)であった。  
主な副作用は嘔気213件(2.13%)、腹痛181件(1.81%)、食欲不振115件(1.15%)、消化不良107件(1.07%)、嘔吐62件(0.62%)等であった。また、臨床検査値においては特に一定の傾向を示す変動は認められていない。

#### (1) 重大な副作用

1) 中毒性表皮壊死症(Lyell症候群)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、紅皮症：中毒性表皮壊死症(頻度不明)、皮膚粘膜眼症候群(0.1%未満)、紅皮症(0.1%未満)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、紅斑、水疱・びらん、結膜炎、口内炎、発熱等があらわれた場合には、中毒性表皮壊死症、皮膚粘膜眼症候群、紅皮症の前駆症状である可能性があるため、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

\* 2) 過敏症候群(頻度不明)：初期症状として発疹、発熱がみられ、さらにリンパ節腫脹、肝機能障害、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。

3) 心室頻拍：心室頻拍(Torsades de pointesを含む)(0.1%未満)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

4) 腎不全：腎不全(頻度不明)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

5) 幻覚、錯乱：幻覚(頻度不明)、錯乱(頻度不明)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

6) 肝機能障害、黄疸：AST(GOT)、ALT(GPT)、 $\gamma$ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害(0.1～5%未満)、黄疸(0.1%未満)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

7) 間質性肺炎、好酸球性肺炎：間質性肺炎(頻度不明)、好酸球性肺炎(頻度不明)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

#### (2) 重大な副作用(類薬)

心停止、心室細動、失神、洞房ブロック、房室ブロック、徐脈：本剤と類似のNaチャンネル阻害作用を有する薬剤でこのような症状があらわれることがあるので、定期的かつ必要に応じて心電図検査を実施し、異常が観察された場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

#### (3) その他の副作用

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
* 循環器	動悸	徐脈、起立時めまい、QRS延長、血圧上昇、浮腫、胸部圧迫感、心房細動	低血圧
* 消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃・腹部不快感、口渇、便秘、下痢、腹部膨満感、消化不良、腹痛	嚥下障害、口唇炎、舌炎、胃痙	食道炎、食道潰瘍

	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
精神神経系	振戦、めまい、しびれ感、眠気、頭痛	不眠、耳鳴、眼振、いらいら感、複視、発汗、意識障害	痙攣、譫妄、構音障害
* 過敏症 <sup>(注1)</sup>	痒痒感、全身発疹	発熱、蕁麻疹、紅斑	多形(滲出性)紅斑
肝臓		尿ウロビリノゲンの上昇	
腎臓		BUN、クレアチニンの上昇	腎機能障害
* 血液 <sup>(注2)</sup>		白血球数異常、赤血球減少、色素量減少、ヘマトクリット減少、血小板数異常、好酸球増多、リンパ球減少、好中球増多	顆粒球減少
泌尿器		排尿困難・尿閉、尿失禁	
* その他		咽頭異和感、にがみ、倦怠感、咳、足のこわばり、血清カリウム、総コレステロールの上昇、脱力感、ほてり	味覚異常

注1)このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。

注2)観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止すること。

#### 5. 高齢者への投与

高齢者では、肝・腎機能が低下していることが多く、また、体重が少ない傾向があるなど副作用が発現しやすいので、慎重に投与すること。〔「重要な基本的注意」の項参照〕

#### 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。〕

(2)授乳中の婦人に投与することとを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。

〔母乳中へ移行することが報告されている。〕

#### 7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。

#### 8. 過量投与

(1)症状

過量服用の結果、副作用の項に記載した悪心、眠気、徐脈、低血圧、痙攣、錯乱等の症状の他に、知覚異常及び心停止があらわれたとの報告があるので注意すること。また、症状に応じて適切な処置を行うこと。

(2)処置方法

1)一般的な対症療法が望ましいが、過量服用の可能性のある場合は必要に応じて胃洗浄を行うこと。

2)徐脈、低血圧が重篤な場合、必要に応じてアトロピンを使用するなど適切な処置を行うこと。

3)痙攣等があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、ベンゾジアゼピン系薬剤等の投与、人工呼吸、酸素吸入等必要に応じて適切な処置を行うこと。

#### 9. 適用上の注意

(1)薬剤交付時

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

(2)服用時

食道に停留し、崩壊すると食道潰瘍を起こすことがあるので、多めの水で服用させ、特に就寝直前の服用等には注意すること。

#### 10. その他の注意

本剤とリドカインとの交叉過敏性(交叉アレルギー)についての証明はされていないが、本剤の投与により発現した副作用症状(過敏症状等)が、本剤の投与中止後、リドカイン投与により再発したとの報告がある。

日本ベ-リング-インゲルハム株式会社  
東京都品川区大崎2丁目1番1号