

## 【使用上の注意】改訂のお知らせ

2006年 11月

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

ドパミン作動性パーキンソン病治療剤  
劇薬、指定医薬品、処方せん医薬品<sup>注)</sup>

# ビ・シフロール<sup>®</sup>錠 0.125mg ビ・シフロール<sup>®</sup>錠 0.5mg

(塩酸プラミペキソール水和物製剤)

シフロール及び SIFROL は登録商標です。

注) 注意—医師等の処方せんにより使用すること

®=登録商標

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につきましてご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ビ・シフロール<sup>®</sup>錠 0.125mg・0.5mg の添付文書の【使用上の注意】を下記のとおり改訂致しましたので、お知らせ申し上げます。

つきましては、今後の使用に際しまして遵守して頂きますようお願い申し上げます。

謹言

### I. 改訂内容 ( \_\_\_\_\_ 部 追加・改訂)

改 訂 後				改 訂 前			
4. 副作用 (2) その他の副作用				4. 副作用 (2) その他の副作用			
	5%以上	0.1~5%未満	頻度不明		5%以上	0.1~5%未満	頻度不明
精神神経系	食欲不振 (12.17%)、不眠 (6.53%)	不安、神経過敏、気分高揚感、悪夢、早朝覚醒、ねぼけ様症状、異夢、徘徊	性欲障害 (亢進又は減退)、 <u>過食(体重増加)</u>	精神神経系	食欲不振 (12.17%)、不眠 (6.53%)	不安、神経過敏、気分高揚感、悪夢、早朝覚醒、ねぼけ様症状、異夢、徘徊	性欲障害 (亢進又は減退)
10. その他の注意 (1) ラットのがん原性試験(24ヶ月間混餌投与)において、2mg/kg/日以上の投与量で網膜変性の増加が報告されている。ただし、ヒトにおいて本剤を含む抗パーキンソン剤と網膜変性との関連性は認められなかったとの臨床試験成績が報告されている。 (2) レボドパ及びドパミン受容体作動薬を投与されたパーキンソン病患者において病的賭博(個人的生活の崩壊等の社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、持続的にギャンブルを繰り返す状態)が報告されている。				10. その他の注意 ラットのがん原性試験(24ヶ月間混餌投与)において、2mg/kg/日以上の投与量で網膜変性の増加が報告されている。ただし、ヒトにおいて本剤を含む抗パーキンソン剤と網膜変性との関連性は認められなかったとの臨床試験成績が報告されている。			

## II. 改訂理由

### 自主改訂

#### 【その他の副作用】の項

「過食（体重増加）」について

本剤の CCDS (Company Core Data Sheet : 企業中核データシート)\*が改訂され、「過食等」が追記されたことから、「その他の副作用」の項に追記しました。

#### 【その他の注意】の項

「病的賭博」について

Szarfman<sup>1)</sup>らは、米国食品医薬品局 (FDA) の有害事象報告システム (Adverse Event Reporting System: AERS) を用いて解析を行った結果、本剤を含む 5 つのドパミン受容体作動薬と Levodopa における「病的賭博」の報告率が他の薬剤に比べて高く、ドパミン受容体作動薬と Levodopa が賭博に対する衝動のコントロールに影響を及ぼす可能性があることを報告しています。

<引用文献>

1. Szarfman A, et al : Arch Neurol 63, 299-300 (2006)

\* : CCDS (Company Core Data Sheet : 企業中核データシート)

CCDSには、安全性情報に加えて、効能又は効果、用法及び用量、薬理学および製品に関するその他の情報が含まれています。ドイツ ベーリンガーインゲルハイム社では収集した安全性情報を評価し、必要に応じて CCDSの変更を行っております。

---

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 No.154 (2006年11月下旬発行予定)」に掲載されます。

---

P. 3~4 に改訂後の【使用上の注意】全文を記載しておりますので、併せてご参照ください。

## 【警告】

前兆のない突発的睡眠及び傾眠等が見られることがあるので、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。

【「重要な基本的注意」、「副作用」の項参照】

## 【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

〔動物(ラット)を用いた生殖発生毒性試験で、妊娠率の低下、生存胎児数の減少及び出生児体重の低下が認められている。〔妊婦、産婦、授乳婦等への投与〕の項参照〕

(2) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

## 【効能・効果】

パーキンソン病

## 【用法・用量】

通常、成人には塩酸プラミペキソール水和物として1日量0.25mgからはじめ、2週目に1日量を0.5mgとし、以後経過を観察しながら、1週間毎に1日量として0.5mgずつ増量し、維持量（標準1日量1.5～4.5mg）を定める。1日量が塩酸プラミペキソール水和物として1.5mg未満の場合は2回に分割して朝夕食後に、1.5mg以上の場合は3回に分割して毎食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減ができるが、1日量は4.5mgを超えないこと。

## ＜用法・用量に関連する使用上の注意＞

(1) 本剤の投与は、少量から開始し、幻覚等の精神症状、消化器症状、血圧等の観察を十分に行い、慎重に維持量（標準1日量1.5～4.5mg）まで増量すること。

【「慎重投与」、「重要な基本的注意」、「副作用」の項参照】

(2) 腎機能障害患者に対する投与方法

本剤は主に尿中に未変化体のまま排泄される。腎機能障害患者（クレアチンクリアランスが50mL/min未満）に本剤を投与すると、腎クリアランスの低下により本剤の消失半減期が延長するため、次のような投与方法を目安に投与回数を調節し腎機能に注意しながら慎重に漸増すること。なお、腎機能障害患者に対する最大1回量は1.5mgとする。また、透析患者あるいは非常に高度な腎機能障害患者での十分な使用経験はないので、このような患者に対しては状態を観察しながら慎重に投与すること。

【「慎重投与」、「高齢者への投与」、「薬物動態」の項参照】

クレアチンクリアランス (mL/min)	投与方法	初回1日投与量	最大1日量
クレアチンクリアランス <math>\geq 50</math>	1日量として 1.5mg未満： 1日2回投与 1日量として 1.5mg以上： 1日3回投与	0.125mg×2回	4.5mg (1.5mg×3回)
50 > クレアチンクリアランス <math>\geq 20</math>	1日2回投与	0.125mg×2回	3.0mg (1.5mg×2回)
20 > クレアチンクリアランス	1日1回投与	0.125mg×1回	1.5mg (1.5mg×1回)

## 【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

(1) 幻覚、妄想等の精神症状又はそれらの既往歴のある患者  
〔症状が増悪又は発現しやすくなることがある（「重要な基本的注意」、「副作用」の項参照）〕

(2) 重篤な心疾患、腎疾患又はそれらの既往歴のある患者  
〔副作用が発現しやすくなるおそれがあり、また、本剤は主に尿中に未変化体のまま排泄される（「重要な基本的注意」、「副作用」、「薬物動態」の項参照）〕

(3) 低血圧症の患者  
〔症状が悪化することがある（「重要な基本的注意」、「副作用」の項参照）〕

(4) 高齢者

【「高齢者への投与」の項参照】

## 2. 重要な基本的注意

(1) 国内臨床試験において、突発的睡眠により自動車事故を起こした例が報告されている。海外で突発的睡眠を経験した症例の中には、傾眠や過度の眠気のような前兆を認めなかった例あるいは投与開始後1年以上経過した後に初めて突発的睡眠が発現した例も報告されている。患者には本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。

【「副作用」の項参照】

(2) 特に投与初期には、めまい、立ちくらみ、ふらつき等の起立性低血圧に基づく症状が見られることがあるので、本剤の投与は少量から開始し、血圧等の観察を十分に行うこと。また、これらの症状が発現した場合には、症状の程度に応じて、減量又は投与を中止するなどの適切な処置を行うこと。

【「副作用」の項参照】

(3) 臨床試験において、本剤を他の抗パーキンソン剤（レボドパ、抗コリン剤、塩酸アママンタジン、ドロキシドパ）と併用した場合、ジスキネジア、幻覚、錯乱等の副作用が発現しやすいことが認められている。これらの副作用があらわれた場合には、減量又は投与を中止するとともに、精神症状が見られた場合には、抗精神病薬の投与を考慮すること。

【「相互作用」、「副作用」の項参照】

(4) 本剤の急激な減量又は中止により、悪性症候群（Syndrome malin）を誘発することがあるので、減量・中止が必要な場合は漸減すること。

【「副作用」の項参照】

## 3. 相互作用

本剤は、肝薬物代謝酵素P-450による代謝をほとんど受けず、主に尿中に未変化体のまま排泄される。

## 【併用注意】（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カチオン輸送系を介して腎排泄される薬剤 シメチジン、塩酸アママンタジン	ジスキネジア、幻覚等の副作用が増強することがある。このような場合には、本剤を減量すること。	カチオン輸送系を介して腎排泄される薬剤との併用により、双方あるいはいずれかの薬剤の腎尿細管分泌が減少し、腎クリアランスが低下することがある。【「薬物動態」の項参照】
鎮静剤 アルコール	作用が増強するおそれがある。	機序は明らかではないが、本剤との併用により作用増強の可能性が考えられる。
ドパミン拮抗剤 フェンチアジン系薬剤、ブチロフェノン系薬剤、メトクロプラミド	本剤の作用が減弱するおそれがある。	本剤はドパミン作動薬であり、併用により両薬剤の作用が拮抗するおそれがある。
抗パーキンソン剤 レボドパ、抗コリン剤、塩酸アママンタジン、ドロキシドパ	ジスキネジア、幻覚、錯乱等の副作用が増強することがある。	相互に作用が増強することがある。

## 4. 副作用

国内の臨床試験において、総症例337例中242例（71.81%）に臨床検査値の異常を含む副作用が報告されている。主な副作用は、ジスキネジア59例（17.51%）、傾眠57例（16.91%）、嘔気57例（16.91%）、消化不良55例（16.32%）、幻覚52例（15.43%）等であった。臨床検査の特定の項目において、異常変動が偏ることはなかった。（承認時）

## (1) 重大な副作用

## 1) 突発的睡眠（0.1～5%未満）

前兆のない突発的睡眠があらわれることがあるので、このような場合には、減量、休業又は投与中止等の適切な処置を行うこと。

2) 幻覚(15.43%)、妄想、せん妄、激越(0.1~5%未満)、錯乱(頻度不明注<sup>1)</sup>)  
 幻覚(主に幻視)、妄想、せん妄、激越、錯乱があらわれることがあるので、このような場合には、減量又は投与を中止するとともに、必要に応じて抗精神病薬を使用するなどの適切な処置を行うこと。

3) 悪性症候群(頻度不明注<sup>1)</sup>)

本剤の急激な減量又は中止により、悪性症候群があらわれることがある。観察を十分に行い、発熱、意識障害、無動無言、高度の筋硬直、不随意運動、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗、血清CK(CPK)の上昇等があらわれた場合には悪性症候群の症状である可能性があるため、再投与後、漸減し、体冷却、水分補給等の適切な処置を行うこと。

注1) 海外添付文書に記載されたものであるため頻度不明(国内の臨床試験では認められなかった副作用)。

(2) その他の副作用

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

	5%以上	0.1~5%未満	頻度不明
皮膚		多汗、蕁麻疹、網状皮斑	
筋・骨格系	CK(CPK)上昇(7.55%)	背部痛、腰痛	
中枢・末梢神経系	ジスキネジア(17.51%)、傾眠(16.91%)、めまい(12.46%)	頭痛、ジストニア、緊張亢進、舌麻痺、運動過多、ミオクローヌス、声が出にくい、異常感覚、知覚減退、パーキンソンニズムの増悪	
自律神経系	口内乾燥(8.31%)	起立性低血圧、高血圧、唾液増加	
感覚器		苦味、眼のちらつき、複視、羞明	
* 精神神経系	食欲不振(12.17%)、不眠(6.53%)	不安、神経過敏、気分高揚感、悪夢、早朝覚醒、ねぼけ様症状、悪夢、徘徊	性欲障害(亢進又は減退)、過食(体重増加)
消化管	嘔気(16.91%)、消化不良(16.32%)、便秘(11.28%)、嘔吐(6.23%)	腹痛、胃潰瘍、口内炎、胃炎、鼓腸放屁、イレウス	
肝臓		肝機能異常(AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、LDH上昇等)	
内分泌		プロラクチン低下、成長ホルモン上昇	
代謝		血糖値上昇	
循環器		心悸亢進、低血圧	
泌尿器系		排尿頻回、尿蛋白陽性	
一般的全身障害		末梢性浮腫、胸痛、倦怠感、疲労感、脱力感、手がビリビリする、転倒	

注2) 減量又は投与を中止する場合は、悪性症候群が発現することがあるので、慎重に漸減することが望ましい。

5. 高齢者への投与

- (1) 臨床試験において65歳以上の高齢者で非高齢者に比し、幻覚等の精神症状の発現率が高い傾向が認められているので、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。幻覚等の精神症状があらわれた場合には、減量又は投与を中止するとともに、必要に応じて抗精神病薬を使用するなどの適切な処置を行うこと。
- (2) 本剤は主に尿中に未変化体のまま排泄されるが、高齢者では腎機能が低下していることが多いので、少量(1日1回0.125mg)から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。  
 [「薬物動態」の項参照]

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、投与しないこと。  
 [妊娠中の婦人に対する使用経験がなく、安全性は確立していない。なお、動物(ラット)を用いた生殖発生毒性試験で、次のことが認められている。]  
 1) 受胎能及び一般生殖能試験(Seg. I)(2.5mg/kg)で、血清プロラクチン濃度の低下に基づく妊娠率の低下が認められている。  
 2) 器官形成期投与試験(Seg. II)(1.5mg/kg)で、血清プロラクチン濃度の低下に基づく生存胎児数の減少が認められている。  
 3) 周産期及び授乳期投与試験(Seg. III)(0.5mg/kg以上)で、血清プロラクチン濃度の低下に基づく出生児体重の低下が認められている。
- (2) 授乳中の婦人には投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。  
 [ヒトにおいてプロラクチン分泌を抑制することが報告されており、乳汁分泌を抑制する可能性がある。なお、動物実験(ラット)で乳汁中へ移行することが認められている。]

7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。(使用経験がない)

8. 過量投与

- (1) 症状  
 本剤の過量投与により、悪心、嘔吐、過度の鎮静、運動過多、幻覚、激越、低血圧等の症状の発現が予想される。
- (2) 処置  
 精神症状が見られた場合には、抗精神病薬の投与を考慮する。また、胃洗浄、活性炭の使用、輸液の点滴静注、心電図モニター等の適切な処置とともに、一般的な支持療法も考慮すること。なお、血液透析による除去は期待できない。[「薬物動態」の項参照]

9. 適用上の注意

薬剤交付時

- (1) PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。  
 [PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]
- (2) 本剤は光に対して不安定なため、服用直前にPTPシートから取り出すよう指導すること。

10. その他の注意

- (1) ラットのがん原性試験(24ヶ月間混餌投与)において、2mg/kg/日以上  
 の投与量で網膜変性の増加が報告されている。ただし、ヒトにおいて本剤を含む抗パーキンソン剤と網膜変性との関連性は認められなかったとの臨床試験成績が報告されている。

\* (2) レボドパ及びドパミン受容体作動薬を投与されたパーキンソン病患者において病的賭博(個人的生活の崩壊等の社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、持続的にギャンブルを繰り返す状態)が報告されている。