

「患者様向け封入資材」改訂のお知らせ

ジオトリフ®錠20mg・30mg・40mg・50mg

2016年7月
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、「ジオトリフ®錠20mg・30mg・40mg・50mg」の「患者様向け封入資材」の改訂を致しますので、
謹んでご案内申し上げます。

なお、製剤、各種コードに変更はございません。

何卒ご高配賜りますようお願い申し上げます。

謹白


記

変更内容

「患者様向け封入資材」の改訂を致します。

変更前

オモテ面



ジオトリフを服用される方へのお知らせ

ジオトリフの飲み方は、次のとおりです。

- 少なくとも**食事の1時間以上前**、または**食後3時間以降**に飲んでください。
- ご自身の生活リズムに合わせて、1日1回、毎日決まった時間に飲んでください。

服用時間

午前 午後 時 分

服用回数

mg 錠

●飲み忘れた場合

①服用時間に近い場合(8時間以内)は、服用せずに、次の決められた時間に定められた用量を服用してください。


②次の服用時間まで8時間以上ある場合は、すぐに服用してください。

●薬剤保管上の注意

本剤は湿気と光に不安定なため、服用直前に開封し、開封後は湿気と光を避けて保存してください。

注意すべき症状は裏面参照▶

変更後



ジオトリフを服用される方へのお知らせ

ジオトリフは1日1回、毎日同じ時間の空腹時に服用

- ジオトリフは、1日1回、毎日同じ時間の**空腹時(食前の1時間以内、食後の3時間以内を避けて)**に、コップ1杯の水やぬるま湯で服用してください。

ジオトリフの服用時間

38時間前 18時間後

朝食や薬剤との相関の上、記入しましょう

●飲み忘れた場合など

●服用時間に近い場合(8時間以内)は、服用せずに、次の決められた服用時間に定められた用量を服用してください。


●服用時間に近い場合(8時間以内)は、服用せずに、次の決められた服用時間に定められた用量を服用してください。

②次の服用時間まで8時間以上ある場合は、食後の条件(例)の食事から8時間以上経過後、次の食事まで7時間以上経過後(食事)を減らすことができれば、服用することができます。


●薬剤保管上の注意

本剤は湿気と光に不安定なため、服用直前に開封し、開封後は湿気と光を避けて保存してください。

注意すべき症状は裏面参照▶



【封入イメージ(従来通り添付文書と結束して封入致します)】



■変更品の出荷予定時期および各種コード

品名	包装単位	統一商品コード	変更前 最終製造番号	変更後 初回製造番号	出荷時期* (予定)	販売包装単位コード 調剤包装単位コード
ジオトリフ [®] 錠 20mg	14錠 (7錠×2)PTP	413400510	689001	689101	2016年7月下旬	 (01)14987413400517 (01)04987413950640
ジオトリフ [®] 錠 30mg	14錠 (7錠×2)PTP	413400619	689001	689101	2016年8月下旬	 (01)14987413400616 (01)04987413950657
ジオトリフ [®] 錠 40mg	14錠 (7錠×2)PTP	413400718	589002	689001	2016年8月中旬	 (01)14987413400715 (01)04987413950664
ジオトリフ [®] 錠 50mg	14錠 (7錠×2)PTP	413400817	589001	未定	2017年7月上旬	 (01)14987413400814 (01)04987413950671

*在庫状況により変更品がお手元に届く時期が若干前後することがありますが、ご容赦賜りますようお願いいたします。

以上

【お問い合わせ先】

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
DIセンター：0120-189-779

【受付時間】 9:00～18:00(土・祝日・弊社休業日を除く)