

プラザキサ®を服用している患者さんへ

プラザキサ®服用時の注意点

1

1日2回きちんと飲みましょう。勝手に服薬をやめたり、飲む量や回数を変えないでください。

2

飲み忘れた場合でも、決して2回分を一度に飲まないでください。

3

次のことがある場合は、必ず事前にかかりつけの医師に相談してください。

- 手術・内視鏡検査・抜歯の予定があるとき
- 別の医療機関にかかるとき
- 新たに他のお薬の服用、服用していた他のお薬を中止するとき

4

以下の症状があらわれた場合、すぐにかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。

- 鼻や歯ぐきなどから出血が続く
- あざ(内出血)ができた
- 血尿や血便(赤色・黒色便)がでた
- 胸やけ・はきけ・むかつき
- 転倒した、体(特に頭)をぶつけた
- 脱水症状



【怪我などの出血で不安になったら】

血が止まるまで、通常より時間がかかります。
出血したところを手指でしっかりと押さえ続けてください。

裏面もご覧ください

プラザキサ®の上手な飲み方のご紹介

プラザキサ®は食直前
(いただきますのすぐ前に)または
食事中にコップ1杯の水で飲みましょう。



水をコップ1杯分用意し
ます。



PTPシートからとりだ
したカプセルと、水を口
に含みます。



あごを引いて*、水と 残り
の水を飲んで、胃の
一緒に飲み込みます。 中
にしっかり入れます。



※プラザキサ®カプセルは水に浮きます。あごを引くと、口の中の水に
浮いた状態となり、水と一緒に飲み込みやすくなります。

▲ 服用シール

プラザキサ®カプセルが
飲みにくいと感じたら、
以下の二次元コードを読み取り、
動画をご視聴ください。



カプセルのお薬がうまく服用できる良い例



▲ 服用シール

これらのシールはお薬手帳などに貼付してご活用ください

プラザキサ®服用中の患者さんへ

突然の怪我などによる出血等の際に、血液をサラサラにする作用を打ち消す「中和剤」が抗凝固薬の種類ごとに存在します。

万が一の際、医療関係者にプラザキサ®を服用していることをすぐに伝えられるよう、いつも持ち歩くものに右のシールを貼付してください。

私は抗凝固薬
プラザキサ®を
服用しています。

▲ 服用シール

私は抗凝固薬
プラザキサ®を
服用しています。

▲ 服用シール